

NEUES KOMBINATIONS- PRÄPARAT

VarroMed® ist das erste zugelassene Bienenarzneimittel für die gesamte EU, welches von der Europäischen Kommission zugelassen wurde.

VarroMed® wird in einer 555 ml Flasche mit einem integrierten Tropfer und einer praktischen Skala zum einfachen Dosieren geliefert.

VarroMed® ist ein gebrauchsfertiges Produkt - mit nur natürlich vorkommenden Inhaltsstoffen - und einer Kombination von zwei aktiven Substanzen - Ameisensäure und Oxalsäuredihydrat. VarroMed® hat 0-Tage Wartezeit und ist für die Bioimkerei geeignet.

VarroMed® kann im Frühling, Spätsommer/Herbst und Winter zur Varroabehandlung eingesetzt werden - und ist mit und ohne Brut anwendbar.

Das Produkt wurde speziell für Bienen entwickelt, ist sofort einsatzbereit und schnell in der Anwendung.


VarroMed® ist in allen EU-Ländern rezeptfrei erhältlich.

**BEEVITAL GMBH
KONTAKT**


T : +43 6219 20645
info@beevital.com
Handelstr. 6
5162 Obertrum AUSTRIA

PRODUKTVORTEIL

E



3-JAHRESZEITEN BEHANDLUNG



GEBRAUCHSFERTIG



WETTER & TEMPERATUR UNABHÄNGIG



FÜR DIE BIOIMKEREI GEEIGNET

VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml



**AB SOFORT
IM IMKEREI-
FACHHANDEL
ERHÄLTICH**



EU/2/16/203



**AB SOFORT
IN APOTHEKE
ODER BEI
TIERARZT
ERHÄLTICH**

AT: VarroMed® 5 mg/ml Ameisensäure+ 44 mg/ml Oxalsäuredihydrat, Dispersion zur Anwendung in Bienenvölkern von Honigbienen. Rezeptfrei, Abgabe: Apotheken, Drogerien und Imkereifachhandel (gem. §59 Abs 7 AMG).

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

DE: VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml Dispersion zur Anwendung in Bienenvölkern von Honigbienen. Ameisensäure/Oxalsäure- Dihydrat; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Varroose (Varroa destructor) in Bienenvölkern mit oder ohne Brut. **Warnhinweise:** Bei der Anwendung des Tierarzneimittels Schutzkleidung, säureresistente Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Lesen sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Wartezeit:** Honig: **0 Tage;** ***Apothekenpflichtig**


Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

NEU
AM
MARKT!

VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml

DIE ERSTE 3-JAHRESZEITEN VARROA BEHANDLUNG



PROTECTING YOUR BEES
www.beevital.com

WIE WIRD

VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml

VERWENDET?



Praktische Skala
zum einfachen
Dosieren

WANN WIRD VARROMED® VERWENDET?

5 mg/ml + 44 mg/ml



1. Nachmittag/Abend

2. Dosis pro Volk nach Volksstärke

	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
	15 ml	15-30 ml	30-45 ml	45 ml

3. vor Gebrauch schütteln

4. Zwischen Wabengassen aufbringen

5. Nach 6 Tagen Milben zählen...

6. ...Wiederholung nach Bedarf (wenn nötig)

VarroMed® kann im Frühling, Spätsommer/Herbst und Winter zur Varrobehandlung eingesetzt werden - und ist mit und ohne Brut anwendbar.

Speziell durch die Frühlingsbehandlung wird eine frühe Bekämpfung der Milben erreicht. Damit wird ein kritischer Befall im Sommer vermieden.

VarroMed® wurde in Feldstudien in verschiedenen europäischen Klimazonen intensiv wissenschaftlich getestet.

VarroMed® zeichnet sich durch hervorragende Wirksamkeit, Wetter- und Temperaturunabhängigkeit aus.

FRÜHLING	SOMMER	HERBST	WINTER									
<p>FRÜHLING: 1 ODER 3 BEHANDLUNGEN</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><10 ✓</td> <td>>10 +2</td> </tr> </table>		<10 ✓	>10 +2	<p>SPÄTSOMMER / HERBST: 3 - 5 BEHANDLUNGEN</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><90 ✓</td> <td><150 ✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>>90 +1-2</td> <td>>150 +1-2</td> </tr> </table>		<90 ✓	<150 ✓		>90 +1-2	>150 +1-2	<p>WINTER: 1 BEHANDLUNG</p>	<p>WINTER: 1 BEHANDLUNG</p>
	<10 ✓	>10 +2										
	<90 ✓	<150 ✓										
	>90 +1-2	>150 +1-2										